

# Recevoir SPIKEVAX<sup>MC</sup> (elasomèran vaccin ARNm)

## À quoi s'attendre pendant et après l'injection

SPIKEVAX<sup>MC</sup> (elasomèran vaccin ARNm) est indiqué pour l'immunisation active des personnes âgées de 12 ans et plus, contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) causée par le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2).

### Avant de recevoir le vaccin

Informez le vaccinateur si vous êtes dans l'une des situations suivantes :

- Vous avez des allergies
- Vous avez déjà eu des épisodes de myocardite (inflammation du muscle cardiaque) et/ou de péricardite (inflammation de l'enveloppe entourant le cœur)
- Vous avez de la fièvre, une infection grave ou une maladie grave
- Vous avez un problème de saignement ou prenez des médicaments qui éclaircissent le sang (anticoagulants)
- Vous êtes immunodéprimé ou prenez un médicament qui affecte votre système immunitaire
- Vous êtes enceinte, vous prévoyez le devenir ou vous allaitez
- Vous avez reçu un autre vaccin contre la COVID-19
- Vous vous êtes déjà évanoui en lien avec une injection

Pour plus de renseignements, consultez le site <https://www.modernacovid19global.com/ca/fr>

### Après avoir reçu le vaccin

Les effets secondaires suivants sont des effets secondaires courants ou très courants de SPIKEVAX. La plupart de ces effets secondaires sont légers et ne durent pas longtemps.

- Douleur au site d'injection
- Frissons
- Augmentation du volume des ganglions lymphatiques
- Fatigue
- Fièvre
- Hypoesthésie (diminution du sens du toucher ou de la sensibilité, engourdissement)
- Maux de tête
- Enflure ou rougeur au site d'injection
- Étourdissements
- Courbatures et raideur musculaire
- Nausées et/ou vomissements

Informez le vaccinateur si vous présentez des effets secondaires qui vous dérangent ou qui ne disparaissent pas.

**Si vous pensez avoir une réaction allergique au vaccin, appelez le 9-1-1 ou rendez-vous à l'hôpital le plus proche.**

Les symptômes d'une réaction allergique sont notamment les suivants : urticaire (bosses sur la peau qui, souvent, démangent beaucoup); enflure du visage, de la langue ou de la gorge; difficulté à respirer.

## Une deuxième dose de SPIKEVAX est NÉCESSAIRE

Complétez la vaccination **1 mois** après votre première dose de SPIKEVAX.

Pour vous aider à vous souvenir de ce rendez-vous :

Fixez immédiatement votre prochain rendez-vous **après avoir reçu votre première dose du vaccin.**



Demandez à ce qu'on vous remette une **Carte de rappel de la 2<sup>e</sup> dose** à afficher bien en évidence à la maison.



Programmez un **rappel** sur votre téléphone cellulaire ou inscrivez le rendez-vous dans votre calendrier.



**Pour plus de renseignements, parlez à votre vaccinateur ou appelez le Service à la clientèle de Moderna au : 1 866 MODERNA (1 866 663-3762)**

## RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L'INNOCUITÉ

SPIKEVAX<sup>MC</sup> (elasomèran vaccin ARNm) est un vaccin utilisé pour prévenir la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) causée par le virus SRAS-CoV-2. Il peut être administré aux personnes âgées de 12 ans et plus. Comme pour tout vaccin, SPIKEVAX peut ne pas protéger complètement tous les individus qui le reçoivent. Même après avoir reçu les deux doses du vaccin, continuez à suivre les recommandations des représentants locaux de la santé publique pour prévenir la propagation de la COVID-19. Les individus peuvent ne pas être protégés de façon optimale avant d'avoir reçu la deuxième dose du vaccin.

Les effets secondaires les plus courants ou très courants de SPIKEVAX sont une douleur au site d'injection, de la fatigue, des maux de tête, des courbatures et de la raideur musculaire, des frissons, de la fièvre, une enflure ou une rougeur au site d'injection, des nausées et/ou des vomissements et une augmentation du volume des ganglions lymphatiques. Des réactions allergiques peuvent également survenir.

La vaccination peut ne pas convenir à tout le monde, demandez donc à votre professionnel de la santé si SPIKEVAX est approprié pour vous. Vous trouverez tous les renseignements sur le produit à l'adresse <https://www.modernacovid19global.com/ca/fr/>. Pour signaler un effet indésirable, veuillez composer le **1 866 MODERNA (1 866 663-3762)**.